

レジメン名：SIR（S-1+イリノテカン）療法

がん種：大腸がん

1 コースの期間：21日

| No. | 薬品名 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | 備考 |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|------|------|-------------------------------|---|----|---|----|----|
| | | | | | 1 | ～ | 15 | ～ | 21 | |
| 1 | パロノセトロン デキサメタゾン ブチルスコポラミン | 0.75 mg 6.6 mg 20 mg | 点滴静注 | 15分 | ○ | | | | | |
| 2 | イリノテカン 生理食塩液 | 150 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 90分 | ○ | | | | | |
| 3 | 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ○ | | | | | |
| 4 | テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠 | 80-120 mg/day | 経口 | 2週間 | 1日2回 朝夕食後 Day1夕～Day15朝まで内服 | | | | | |

メモ：

◎テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠は体表面積（BSA）にあわせて下記の用法・用量にて内服

BSA < 1.25 m² : 80 mg/day 2×朝夕食後

1.25 m² ≦ BSA < 1.5 m² : 100 mg/day 2×朝夕食後

1.5 m² ≦ BSA : 120 mg/day 2×朝夕食後

更新日：2023年7月