

## レジメン名：SOX+ベバシズマブ療法

がん種：大腸がん

1 コースの期間：21日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日					備考
					1	～	15	～	21	
1	パロノセトロン デキサメタゾン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.75 mg 6.6 mg 5 mg	点滴静注	15分	○					
2	ベバシズマブ 生理食塩液	7.5 mg/kg 100 mL	点滴静注	90分*	○					*2回目は60分、 3回目以降は30分に短縮可能
3	オキサリプラチン デキサメタゾン** 5%ブドウ糖液	130 mg/m <sup>2</sup> 6.6 mg 500 mL***	点滴静注	2時間	○					**CVポートから投与の場合は省略 ***CVポートから投与の場合は250 mL
4	5%ブドウ糖液	50 mL	点滴静注	15分	○					
5	テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠	80-120 mg/day	経口	2週間	1日2回 朝夕食後 Day1夕～Day15朝まで内服					

◎テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠は体表面積（BSA）にあわせて下記の用法・用量にて内服

BSA < 1.25 m<sup>2</sup> : 80 mg/day 2×朝夕食後

1.25 m<sup>2</sup> ≤ BSA < 1.5 m<sup>2</sup> : 100 mg/day 2×朝夕食後

1.5 m<sup>2</sup> ≤ BSA : 120 mg/day 2×朝夕食後

◎アレルギー対策強化レジメンの場合は下記のように変更

No.1のデキサメタゾンを6.6 mg→16.5 mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩を5 mg→10 mgに変更

No.3のオキサリプラチンの投与時間を2時間→4時間に変更

更新日：2023年7月