

## レジメン名：FOLFIRI+ベバシズマブ療法

がん種：大腸がん

1コースの期間：14日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日			備考
					1	～	14	
1	パロノセトロン デキサメタゾン ブチルスコポラミン	0.75 mg 6.6 mg 20 mg	点滴静注	15分	○			
2	ベバシズマブ 生理食塩液	5 mg/kg 100 mL	点滴静注	90分*	○			*2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可能
3	イリノテカン 5%ブドウ糖液	150 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	2時間	○			No.4と同時に投与
4	レボホリナート 5%ブドウ糖液	200 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	2時間	○			No.3と同時に投与
5	フルオロウラシル 5%ブドウ糖液	400 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	急速静注	5分	○			
6	生理食塩液	50 mL	急速静注	5分	○			
7	フルオロウラシル 生理食塩液	2400 mg/m <sup>2</sup> 合計100 mL**	持続静注	46時間	○			**フルオロウラシルと合計して100 mLで投与

メモ：

◎No.7はインフューザーポンプを使用

更新日：2023年7月