

レジメン名：EC（エピルビシン+エンドキサン）療法

がん種：乳がん

1 コースの期間：21日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日			備考
					1	～	21	
1	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75 mg 9.9 mg	点滴静注	15分	○			
2	生理食塩液	50 mL	点滴静注	10分	○			No.4投与前に流す
3	エンドキサン 生理食塩液	600 mg/m ² 100 mL	点滴静注	30分	○			No.4と同時に投与
4	エピルビシン 生理食塩液	90 mg/m ² 50 mL	点滴静注	5分	○			No.3と同時に投与
5	生理食塩液	50 mL	点滴静注	10分	○			No.4投与後に流す
6	生理食塩液	50 mL	点滴静注	10分	○			

メモ：

◎悪心予防として下記を内服。

- ・ アプレピタント125 mg/day 化学療法初日（Day1）、化学療法開始前に内服 病院に持参
アプレピタント80 mg/day 1×朝食後 治療翌日から内服（Day2-3）
- ・ デキサメタゾン錠4 mg/day 2×朝昼食後 3日分 治療翌日より内服開始（Day2-4）

◎術前・術後補助化学療法の場合は4コースまで