

レジメン名：XELOX（カペシタビン+オキサリプラチン）療法

がん種：胃がん

1 コースの期間：21日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日					備考
					1	～	15	～	21	
1	ホスアプレピタント 生理食塩液	150 mg 250 mL	点滴静注	40分	○					※投与しない場合もあり ホスアプレピタント235 mgに 代替する場合もあり
2	パロノセトロン デキサメタゾン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.75 mg 6.6 mg 5 mg	点滴静注	15分	○					
3	オキサリプラチン デキサメタゾン 5%ブドウ糖液	130 mg/m ² 6.6 mg 500 mL	点滴静注	2時間	○					
4	5%ブドウ糖液	50 mL	点滴静注	15分	○					
5	カペシタビン錠	2000 mg/m ²	経口	2週間	1日2回 朝夕食後 Day1夕～Day15朝まで					

メモ：◎術後補助化学療法の場合は8コースまで

◎カペシタビンは体表面積（BSA）にあわせて下記の用法・用量にて内服

BSA < 1.36 m² : 2400 mg/day 2×朝夕食後

1.36 m² ≤ BSA < 1.66 m² : 3000 mg/day 2×朝夕食後

1.66 m² ≤ BSA < 1.96 m² : 3600 mg/day 2×朝夕食後

1.96 m² ≤ BSA : 4200 mg/day 2×朝夕食後

◎アレルギー対策強化レジメンの場合は下記のように変更

No.2のデキサメタゾンを6.6 mg→16.5 mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩を5 mg→10 mgに変更

No.3のオキサリプラチンの投与時間を2時間→4時間に変更

更新日：2023年11月