

SGLT2阻害薬フォーミュラリー

※ 推奨対象に該当しない場合は、第1推奨薬への切り替えをご検討下さい。

標準治療薬の推奨リスト		薬価（円）	推奨／選択理由
第1 推奨薬	ジャディアンス錠10mg	188.9	『2型糖尿病』『慢性心不全』『慢性腎臓病』のすべての適応を有するのはジャディアンス錠とフォシーガ錠のみ 『1型糖尿病』の適応を有するのはフォシーガ錠のみ - 個々のSGLT2阻害薬間の優劣について一貫した結果は得られていないが、エンバグリフロジン（ジャディアンス）およびダパグリフロジン（フォシーガ）は有効性に関するエビデンスが豊富 - ジャディアンス錠を『2型糖尿病』で25mg/回 服用する場合は、散剤調剤でオーダーする必要あり（入院の場合）
	フォシーガ錠 5mg	169.9	
	10mg	250.7	
条件付き 使用薬	【限】カナグル錠100mg	158.5	【使用対象】 持参薬で安定して継続しており、推奨薬で代替しづらい場合

切り替え時の標準的換算量（推奨薬への切り替え検討時に参考にして下さい。）							
・ 効能効果の差異に注意		適応症	腎機能 eGFR（mL/min/1.73m ² ）				肝障害時
			正常		中等度	重度	
			効果不十分	通常量			
第 1 推奨薬	ジャディアンス錠10mg	2型糖尿病	25mg (322.6円)	10mg (188.9円)	慎重投与 (＜45)	投与しない	通常量
		慢性心不全 慢性腎臓病		10mg (188.9円)		慎重投与 (＜20)	
第 1 推奨薬	フォシーガ錠5mg・10mg	1型・2型 糖尿病	10mg (250.7円)	5mg (169.9円)	慎重投与 (＜45)	投与しない	通常量
		慢性心不全 慢性腎臓病		10mg (250.7円)		慎重投与 (＜25)	

↑ 持参薬の代替

条件付き 使用薬	【限】カナグル錠※ ※推奨薬へ変更しづらい理由がある場合は、 患者限定で使用可能	慢性腎臓病 (2型糖尿病合併)		100mg (158.5円)		新規不可 継続慎重投与	
		2型糖尿病		100mg (158.5円)	慎重投与	投与 しない	
採用 なし	スーグラ錠	1型・2型 糖尿病	100mg	50mg (170.4円)			
採用 なし	デベルザ錠	2型糖尿病		20mg (164.1円)			
採用 なし	ルセフィ錠・ODフィルム	2型糖尿病	5mg	2.5mg (149円)			

【参考資料】 FINDAT（糖尿病診療ガイドライン2024、高齢者糖尿病診療ガイドライン2023、2021年JCS/JHFSガイドラインフォーカスアップデート版急性・慢性心不全診療、エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023）、各製品の添付文書・インタビューフォーム