

レジメン名：キイトルーダ+カルボプラチン+フルオロウラシル療法

がん種：頭頸部がん

1 コースの期間：21日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日						備考
					1	2	3	4	～	21	
1	ソルデム3A	200 mL	点滴静注	2時間	○						
2	生理食塩液	50 mL	点滴静注	全開	○						
3	キイトルーダ 生理食塩液	200 mg/body 100 mL	点滴静注	30分	○						
4	生理食塩液	50 mL	点滴静注	全開	○						
5	ソルデム3A	200 mL	点滴静注	1時間	○						
6	ホスアプレピタント 生理食塩液	150 mg 50 mL	点滴静注	30分	○						
7	生理食塩液	50 mL	点滴静注	全開	○						
8	パロノセトロン* デキサメタゾン	0.75 mg 9.9 mg**	点滴静注	30分	○	○	○	○			*day2~4は投与なし 代わりに生食100 mLあり **day2~4は6.6mg
9	カルボプラチン 生理食塩液	AUC 5 250 mL	点滴静注	1時間	○						
10	生理食塩液	50 mL	点滴静注	全開	○						
11	フルオロウラシル 生理食塩液	800 mg/m ² 500 mL	点滴静注	24時間	○	○	○	○			

メモ： 最大6コースで、その後はキイトルーダの単剤投与の予定

No.11のフルオロウラシルを投与しない場合は、Day2以降のNo.8投与は無し

代わりにデキサメタゾン錠4～8 mg/day 2～3日分（Day2～3、4）

更新日：2025年8月