

レジメン名：SOX+キイトルーダ療法

がん種：切除不能な進行・再発胃がん

1 コースの期間：21日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日					備考
					1	～	15	～	21	
1	生理食塩液	50 mL	点滴静注	10分	○					
2	キイトルーダ 生理食塩液	200 mg/body 100 mL	点滴静注	30分	○					
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	10分	○					
4	パロノセトロン デキサメタゾン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.75 mg 6.6 mg 5 mg	点滴静注	15分	○					ホスネツピタント235 mgを 追加する場合もあり その場合は15分→30分へ
5	オキサリプラチン デキサメタゾン 5%ブドウ糖液	130 mg/m ² 6.6 mg 500 mL	点滴静注	2時間	○					
6	5%ブドウ糖液	50 mL	点滴静注	15分	○					
7	テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠	80-120 mg/day	経口	2週間	1日2回 朝夕食後 Day1夕～Day15朝まで					

◎テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠は体表面積（BSA）にあわせて下記の用法・用量にて内服

BSA < 1.25 m² : 80 mg/day 2×朝夕食後

1.25 m² ≤ BSA < 1.5 m² : 100 mg/day 2×朝夕食後

1.5 m² ≤ BSA : 120 mg/day 2×朝夕食後

◎アレルギー対策強化レジメンの場合は下記のように変更

No.4のデキサメタゾンを6.6 mg→16.5 mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩を5 mg→10 mgに変更

No.5のオキサリプラチンの投与時間を2時間→4時間に変更

更新日：2026年4月