

レジメン名：FOLFOXIRI+アービタックス療法

がん種：大腸がん

1 コースの期間：14日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日					備考
					1	～	8	～	14	
1	ホスネツピタント* パロノセトロン* デキサメタゾン* ブチルスコポラミン* d-クロルフェニラミンマレイン酸塩*	235 mg 0.75 mg 9.9 mg 20 mg 5 mg	点滴静注	30分*	○		○			*Day8は、 デキサメタゾン6.6 mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩5mg 生理食塩液50mL 15分で投与
2	アービタックス 生理食塩液	400 mg/m ² ** 250 mL	点滴静注	2時間**	○		○			**2回目以降は250 mg/m ² 1時間で投与
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	30分***	○		○			***2回目以降は15分で投与
4	イリノテカン 5%ブドウ糖液	150 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間	○					
5	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85 mg/m ² 250 mL	点滴静注	2時間	○					No.6と同時に投与
6	レボホリナート 5%ブドウ糖液	200 mg/m ² 250 mL	点滴静注	2時間	○					No.5と同時に投与
7	生理食塩液	50 mL	急速静注	5分	○					
8	フルオロウラシル 生理食塩液	2400 mg/m ² 合計100 mL****	持続静注	46時間	○					****フルオロウラシルと合計して100 mL で投与

メモ：

◎No.8はインフューザーポンプを使用

◎アレルギー対策強化レジメンの場合は下記のように変更

No.1のデキサメタゾンを9.9 mg→16.5 mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩を5 mg→10 mgに変更

No.5のオキサリプラチンとNo.6のレボホリナートの投与時間を2時間→4時間に変更

更新日：2026年4月